植 物 分 类 学 报 34(4):438～439(1996)
Acta Phytotaxonomica Sinica

假花佩属,中国菊科植物一个新属*

石 铸 陈艺林
(中国科学院植物研究所,北京 100093)

FABERIOPSIS SHIH ET Y. L. CHEN, GENUS NOVUM FAMILIAE COMPOSITARUM SINENSIUM

Shih Chu Chen Yi-lin
(*Institute of Botany, Academia Sinica*, Beijing 100093)

Key words Compositae; *Faberiopsis*; *Faberiopsis nanchuanensis*; *Faberia*
关键词 菊科;假花佩属;假花佩;花佩属

假花佩属 新属(菊苣族,莴苣亚族)

Faberiopsis Shih et Y. L. Chen, gen. nov. (Tribus Lactuceae, Subtribus Lactucinae)

Herba perennis, lactifera. Rhizoma breve, repens, aliquot radicellas crassitudine aequales edens. Folia longe lineari-elliptica, apice acuminata, basi in petiolos longos vel breves cuneato-attenuata, crassa in textura, subcoriacea, utraque facie glabra, laevia. Capitula 13 in numero, ad apicem caulis ramique corymboso-paniculato-disposita, homogama, ligulata. Involucrum campanulatum vel cuneato-campanulatum, 1.3 cm longum, cujus phyllis 4-seriatis, extimis et exterioribus ovato-triangulatis vel longe ovatis, intimis et interioribus longe ellipticis, omnibus apice acutis vel obtusis, dorso glabris. Flosculi omnes hermaphroditi, ligulati, caerulei. Corollae trisectae, segmentis centralibus latis, ligulatis, apice inaequaliter 3-dentatis, eis lateralibus angustatis, linearibus, apice acutis vel obtusis, omnibus aequilongis; corollae tubis brevibus, glabris. Antherae apice appendicibus oblongis instructae basi sagitatae, Stylus longus, cujus ramis tenuibus, sparse spinulosis, apice obtusis. Achaenia (immatura) elliptico-oblanceolata, glabra, erostrata. Pappi setae bruneolae, scabriusculae.

Genus monotypicum, in Sichuan habitat.

Typus generis: *Faberiopsis nanchuanensis* (Shih) Shih et Y. L. Chen

Faberiae primo adspectu valde similis; genus insigne flosculorum ligulis caeruleis, corollis trisectis, segmentis centralibus ligulatis, latis, apice inaequaliter 3-dentatis, eis lateralibus angustatis, linearibus, omnibus aeguilongis, a generibus nobis notis Tribus Lactuceae distinctum.

---

* 国家自然科学基金重大项目:"三志"编研内容之一。
1996-02-14 收稿。

多年生草本，具有乳汁。根状茎短，匍匐，生少数等粗的细根。叶长线状椭圆形，顶端渐尖，基部楔形收窄，有长或短柄，质地厚，几革质，两面光滑，无毛。头状花序同型，舌状，13 个，在茎枝顶端成伞房圆锥花序排列。总苞钟状或楔钟状，长 1.3 cm；总苞片 4 层，外层及最外层卵状三角形或长卵形，内层及最内层长椭圆形，全部总苞片顶端急尖或钝，外面无毛。全部小花两性，舌状，蓝色；花冠 3 全裂，中央裂片宽，舌形，顶端不等大 3 齿裂，侧生裂片狭，线形，顶端急尖或钝，全部裂片等长；花冠管部短，外面无毛。花药顶端附属物长圆形。基部箭头状，花柱长，花柱分枝细，有稀疏短刺毛，顶端钝。瘦果未成熟，椭圆状倒披针形，无毛，无喙。冠毛褐色，毛状，微粗糙。

乍看，假花佩属很似花佩属 *Faberia*，但该新属以舌状小花蓝色，花冠 3 全裂，中央裂片宽，顶端不等大 3 齿裂，侧生裂片狭窄，线形，全部裂片等长为特征，至为特殊，而与我们已知菊苣族其他各属有非常明显的不同。

假花佩　南川花佩

Faberiopsis nanchuanensis (Shih) Shih et Y. L. Chen, comb. nov. —— *Faberia nanchuanensis* Shih in Act. Phytotax. Sin. **33**(2):195. fig. 7. 1995.

Descriptio adjecta: Planta lactifera. Rhizoma breve, repens, aliquot radicellas crassitudine aequales edens. Flosculi hermaphroditi, ligulati, corollis trisectis, segmentis centralibus latis, ligultatis, apice inaequaliter 3-dentatis, eis lateralibus angustatis, linearibus, apice acutis vel obtusis tubis brevibus glabris. Achaenia immatura elliptico-oblanceolata glabra, erostrata, Pappi setae bruneolae, scabriusculae.

补充记载：植株具乳汁。根状茎短，生少数等粗的细根。小花舌状，两性；花冠 3 全裂，中央裂片宽，顶端不等大 3 齿裂，侧生裂片狭窄，线形，顶端急尖或钝；管部短，无毛。瘦果未成熟，椭圆状倒披针形，无毛，无喙。冠毛褐色，毛状，微糙毛状。花期 6 月。产四川南川。模式采自四川南川。